

# واکسن بزنید

## از خود، خانواده و جامعه خود محافظت کنید

واکسن ها سالانه جان میلیون ها نفر را در سراسر جهان نجات می دهند



واکسن های ارائه شده به نوزادان زیر 1 سال  
کوک خود را واکسینه کنید تا از او در برابر بیماری های جدی محافظت کنید.

8 هفته

فلج اطفال، کزار، سیاه سرفه (Hib) ، هموفیلوس آنفولانزا نوع B در 1 (دیفتری، هپاتیت روتاواروس منژیت ب

12 هفته

6 در 1 (دوز دوم)  
پنوموکوک (پی سی وی)  
روتاواروس (دوز دوم)  
منژیت ب (دوز سوم)

16 هفته

واکسن هایی که برای کودکان 1 تا 16 ساله ارائه می شود  
کوکان باید قبل از ورود به مدرسه تقویت کننده های پیش دبستانی خود را دریافت کنند

یکسالگی

هموفیلوس آنفولانزا نوع B (Hib)/منژیت C  
سرخک، اوریون و سرخجه (MMR)  
پنوموکوکی (پی سی وی) (دوز دوم)  
(دوز سوم)B منژیت

2 تا 10 سالگی

آنفولانزا (به علاوه کوکان  
متبتلا به بیماری های مزمن  
6 ماهه تا 17 ساله)

3 سال و 4 ماهگی

MMR (دوز دوم) تقویت  
کننده پیش دبستانی 4 در 1  
(دیفتری، سیاه سرفه، کزار، و فلج اطفال)

12 تا 13 سالگی

(وبروس پابلوماتی انسانی) HPV

14 سالگی

3 در 1 تقویت کننده نوجوانان (کزار، دیفتری و فلح اطفال)  
مننگوکوک، A,C,W,Y

# واکسن های ارائه شده به بزرگسالان واکسیناسیون خود را به تأخیر نیندازید

زنان حامله

سیاه سرفه  
آنفولانزا

50 ساله به بالا

آنفولانزا (سالیانه پس از  
50 سالگی ارائه می شود)

65 ساله به بالا

پنوموکوک (پی پی وی)

70 تا 79 ساله

زونا

اگر بیماری مزممی مانند دیابت  
دارید، از پزشک عمومی خود  
بپرسید که آیا می توانید  
واکسن های محافظتی  
دیگری مانند واکسن آنفولانزا  
یا پنوموکوک بزنید یا خیر.

واکسینی را به موقع نزدید؟

از پزشک عمومی خود بپرسید  
چگونه می توانید واکسیناسیون  
خانواده خود را انجام دهید

برای رزرو واکسیناسیون با پزشک عمومی خود تماس بگیرید



برای اطلاعات در مورد واکسیناسیون به زبان  
های مختلف به وب سایت ما بروید و روی نماد ترجمه کلیک کنید

Farsi