



# कोई लक्षण नहीं, टीबी की कोई संभावना नहीं

फिर से विचार करें!

क्या आप जानते हैं कि तपेदिक (टीबी) आपके शरीर एक लंबे समय तक में निष्क्रिय हो सकता है  
इसे सुन्त तपेदिक कहा जाता है।

यह बहुत आम है और इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। यह किसी भी समय सक्रिय टीबी बन सकता है - यह इलाज न होने पर  
जानले सकता है - और आपके दोस्तों और परिवार को भी लग सकता है।

यदि आप 16 से 35 वर्ष की आयु के हैं और पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों के अधिकांश देशों से यूके पहुंचे हैं।  
तो आपको अव्यक्त टीबी का अधिक खतरा है:

लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, अफ्रीका, एशिया  
पूर्वी यूरोप, रूस

यदि यह आप हैं:

आपको रक्त परीक्षण के साथ जल्दी और आसानी से अव्यक्त टीबी के



लिए परीक्षण किया जा सकता है

आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना उपचार और परीक्षण निःशुल्क हैं



अपने निःशुल्क अव्यक्त टीबी परीक्षण के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए  
टीबी सेवा से संपर्क करें 024 76964169

टीबी और यूके लेटेंट टीबी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया  
[www.thetruthabouttb.org/latent-tb/](http://www.thetruthabouttb.org/latent-tb/) यहां जाएं



### प्रश्न एवं उत्तर

**प्रश्न** = मुझे सालों पहले बताया गया था कि मैं टीबी से प्रतिरक्षित था और मुझे टीबी के टीके की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मेरी बांह पर परीक्षण ने इसे दिखाया था।

**उत्तर** = कोई भी टीबी से प्रतिरक्षित नहीं है; हो सकता है कि आपको टीबी हो गई हो और आपको अव्यक्त टीबी के लिए जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा, अतीत में एक सकारात्मक परीक्षण का मतलब यह हो सकता है कि आपके पास एक निष्क्रिय रोगाणु हो सकता है और सक्रिय हो सकता है।

**प्रश्न** = मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैंने टीबी का टीका लगवा लिया था

**उत्तर** = यदि आपने बचपन में के रूप में टीबी टीकाकरण किया था, तो भी आप टीबी का संक्रमण हो सकता है क्योंकि टीके की प्रभावशीलता समय के साथ कम हो जाती है, इसलिए आपको अव्यक्त टीबी के लिए जांच करवानी चाहिए।

**प्रश्न** = मैंने टीबी का एक्सरे करवाया है और वय नकारात्मक था।

**उत्तर** = लेटेंट टीबी सक्रिय टीबी से अलग है और छाती के एक्सरे पर नहीं देखा जा सकता है, इसलिए आपको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए।

सक्रिय टीबी के लक्षणों को जानें, यदि आपके पास निम्नलिखित में से एक या अधिक लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए।

- लगातार खांसी (जो 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है)
- थूक में खून के साथ खांसी
- 2 सप्ताह से अधिक समय तक बुखार
- छाती में दर्द
- वजन घटना
- रात को पसीना आना
- भूख न लगना