



TBC

Fără simptome,
nici o șansă de TBC?

GÂNDIȚI-VĂ DIN NOU!

Știați că tuberculoza (TBC) poate fi inactivă în corpul dvs. pentru o lungă perioadă de timp? Acesta se numește TBC latent.

Este foarte comun și NU are simptome. Poate deveni TBC activ în orice moment - acest lucru poate ucide dacă nu este tratat – și poate fi transmis prietenilor și familiei dvs.!

Riscul de tuberculoză latentă este mai mare dacă aveți vârsta între 16 și 35 de ani, și ați ajuns în Marea Britanie în ultimii cinci ani din majoritatea țărilor din următoarele zone:

America Latină, Caraibe, Africa, Asia
Europa de Est, Rusia

Dacă sunteți dvs.:

✓ Puteți fi testat(ă) pentru tuberculoză latentă rapid și ușor cu un test de sânge.

✓ Tratamentul și testarea sunt GRATUITE, indiferent de statutul de imigrare.

Pentru a face o programare pentru testul gratuit pentru TBC latent, contactați Serviciul TBC la numărul 024 76964169

Pentru a afla mai multe despre TBC și programul de screening pentru TBC latent din Marea Britanie, vă rugăm să accesați website-ul: www.thetruthabouttb.org/latent-tb/



Întrebări și răspunsuri

Î = Mi s-a spus cu ani în urmă că sunt imun(ă) la TBC și nu am nevoie de vaccinul TBC, așa cum a arătat testul de pe brațul meu.

R = Nimeni nu este imun la TBC; ați fi putut lua TBC de atunci și ar trebui să fiți testat(ă) pentru tuberculoză latentă. De asemenea, un test pozitiv în trecut ar putea însemna că aveți deja bacteria adormită, iar aceasta se poate trezi și deveni activă.

Î = Sunt protejat(ă) deoarece am făcut vaccinul împotriva tuberculozei.

R = Dacă ați avut un vaccin împotriva tuberculozei în copilărie, tot este posibil să vă infectați cu TBC, deoarece eficacitatea vaccinului se reduce în timp, așadar, ar trebui să fiți testat(ă) pentru tuberculoză latentă.

Î = Am făcut o radiografie TBC și a fost negativă.

R = Tuberculoza latentă este diferită de tuberculoza activă și nu poate fi văzută pe o radiografie toracică, ar trebui să vă testați.

Cunoașteți simptomele tuberculozei active, dacă aveți unul sau mai multe dintre următoarele simptome, trebuie să mergeți la medic.

- Tuse persistentă (care durează mai mult de trei săptămâni)
- Tuse cu sânge în expectorație
- Febră pentru mai mult de două săptămâni
- Durere în piept
- Pierdere în greutate
- Transpirații nocturne
- Pierderea apetitului